



Hypogymnia physodes (L.) Nyl.

Pūslišu hipogimnija

Lapoņa daivas dobjas, bieži uzpūstas, to gali atliekti. Virspuse gaiši pelēka, ar melniem plankumiem, matēta vai mazliet spīdīga. Apakšpuse tumši brūna līdz melna, krunkaina. Ļoti mainīga suga. Mērena vides piesārņojuma indikators.



Parmelia sulcata Taylor

Parmēlija

Virspuse gaišpelēka līdz pelēkai, dažreiz ar gaišu apsarmi. Virspuse tīklveida. Apakšpuse melna, uz malām tumšbrūna ar melnām rizinām. Šī suga ir ar plašu ekoloģisko amplitūdu. Mērena vides piesārņojuma indikators.



Evernia prunastri (L.) Ach.

Plūmjū evernija

Virspuse nelīdzena. Augšpuse pelēki zaļa līdz dzeltenzaļai. Apakšpuse balta. Sorāļi attīstās gar daivu malām. Plaši sastopams ķērpis uz lapu kociem ar vāju vai vidēji skābu pH koku mizas reakciju, kā arī uz apstrādātas koksnes. Mērena vides piesārņojuma indikators.



Usnea hirta

Īsmatīnā usneja

Tās laponis līdzīgs zaļganpelēkam līdz 5 cm garam matu kušķītim. Tā zarus klāj 1 cm garai, tievi izaugumi. Tīras vides indikators.



Pertusaria amara (Ach.) Nyl

Rūgtā pertuzārija

Tas ir grubuļains, gaiši vai tumši pelēks, lielāko tiesu pelnu pelēks, retāk ar zaļganu nokrāsu. Rūgtā garša ir droša šīs sugas atšķiršanas pazīme. Piesārņotas vides indikators.